

Paracetamol (fx Panodil eller Pinex)

Kære forældre

Jeres barn kan i forbindelse med sygdom have gavn af paracetamol. Det sælges som fx Panodil eller Pinex. Hvis barnet har smerter eller er alment påvirket og evt. ikke har lyst til at drikke, kan paracetamol have en god virkning.

Paracetamol gør ikke barnet rask, men kan lindre alment ubehag, ømhed i musklerne og hovedpine, som kan forekomme i forbindelse med feber.

Børn, som normalt er raske, må behandles med paracetamol efter barnets vægt i 2-3 døgn.

Paracetamol skjuler ikke alvorlige sygdomstilstande. Er I bekymrede for barnet, bør barnet altid ses af en læge.

- Paracetamol fås som mikstur, stikpiller, smeltetabletter og tabletter og kan købes i håndkøb på apoteket.
- Døgn-dosis er 50 milligram (mg) pr. kg pr. døgn, fordelt på 3-4 doser (se skemaet). Dvs. barnet kan få paracetamol 3-4 gange (x3 eller x4) i døgnet med 6 timers interval.

Vægt (kg)	Døgn-dosis (mg/kg)	Mikstur 24 mg/ml	Stikpille 125 mg	Stikpille 250 mg	Smelte-tablet 250 mg	Tablet 500 mg
5	250	2,5 ml x 4				
6	300	3,0 ml x 4				
7	350	3,5 ml x 4	1 stikpille x 3			
8	400	4,0 ml x 4				
9	450	4,5 ml x 4	1 stikpille x 4			
10	500	5,0 ml x 4				
11	550	5,5 ml x 4				
12	600	6,0 ml x 4				
13	650	6,5 ml x 4				
14	700	7,5 ml x 4				
15	750	8,0 ml x 4		1 stikpille x 3	1 tablet x 3	
16	800	8,5 ml x 4				
17	850	9,0 ml x 4				
18	900	9,5 ml x 4				
19	950	10,0 ml x 4		1 stikpille x 4	1 tablet x 4	
20	1000	10,5 ml x 4				
25	1250					1 tablet x 3
30	1500					
35	1750					
40	2000					1 tablet x 4
45	2250					
50	2500					
55	2750					2 tabletter x 3
60	3000					
65	3250					
70	3500					
75	3750					2 tabletter x 4
80	4000					